

비구아나이드계

□ 작용기전 및 적응증

간에서 당 생성을 억제하고 장관에서 포도당흡수를 방해하는 작용을 합니다. 식욕을 억제하면서 체중을 감소시키는 역할을 하므로 비만한 환자의 경우 특히 유용합니다.

신장에서 주로 배설되므로 **신장, 또한 간의 장애가 있는 환자에게는 복용을 주의**해야 하며, **조영제를 사용하는 검사(예 : CT 촬영)가 있을 경우 검사 전후로 2-3일 간 복용을 중단**하도록 합니다.

□ 복용방법 : 식사직후 바로 복용

□ 부작용

복용 초기 **식욕부진, 오심, 구토, 복부 불편감, 설사**가 나타날 수 있으나 점차 감소합니다. 드물게 유산혈증으로 인한 권태감, 호흡곤란, 근육통 등이 나타날 수 있으며 증상이 나타나면 반드시 의료진에게 알리도록 합니다.



상 품 명 (제약회사)	성 분 명	색상과 모양	용법·용량
글루코파지(대웅제약)	메트폴민 (250mg / 500mg)		1일 2~3회
다이하넥스XR(대웅제약)	메트폴민 (500mg)		식사 직후에
글루파(다림바이오텍)	메트폴민 (850 / 1000mg)		복용